

## СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

- это вовлечение ребенка в действие с сексуальной окраской с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения или материальной выгоды

- Любое сексуальное насилие – это преступление против личности, целью которого является растоптать, унижить жертву и продемонстрировать свою власть
- Выделяют сексуальное злоупотребление (использование) и собственно сексуальное насилие над ребенком

## ФОРМЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

- Половой акт в прямой или извращенной форме;
- Изнасилования;
- Инцест;
- Совращения;
- Ласки, оцупывание, целование и в том числе тайное прикосновение к интимным частям тела ребенка;
- Рассматривание половых органов ребенка;
- Эксгибиционизм;
- Вуайеризм;
- Притеснение ребенка смущающими взглядами и сексуальными высказываниями;
- Порнография (принуждение ребенка рассматривать порнографические снимки);
- Мастурбация в присутствии ребенка.
- Принудительная проституция.

## ИНДИКАТОРЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ:

### Оральные симптомы:

экзема; дерматит; герпес на лице, губах, в ротовой полости; кроме того, отказ от еды (анорексия); переедание (булимия).

### Анальные симптомы:

повреждения прямой кишки; покраснение ануса; варикозные изменения; ослабление сфинктера; запоры.

### Вагинальные симптомы:

нарушение девственной плевы; расширение влагалища; свежие повреждения (раны, ссадины); сопутствующие инфекции.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ:

- наличие ушибов, покраснения, разрывов или потертостей и ссадин в генитальной или анальной областях;
- наличие гематом и укусов на груди, ягодицах, ногах, нижней части живота, бедрах;
- наличие болезни передающейся половым путем;
- необъяснимое вагинальное или ректальное кровотечение;
- уретральное воспаление, воспаление паховых лимфатических желез или подобные типы воспаления или заразные болезни в пределах генитальной области;
- наличие боли при мочеиспускании, опухоли или выделений, относящихся к половому члену, у мальчиков;
- беременность, особенно у младших подростков.

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ:

### 1) ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЯВЛЕНИЯХ СЕКСУАЛЬНОСТИ:

- чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;
- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
- соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу и взрослым;
- сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного возраста);
- необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста); трение половыми органами о тело взрослого; проституция.



## **2) ИЗМЕНЕНИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ И ОБЩЕНИИ:**

- замкнутость, изоляция, уход в себя;
- неумение внутренне почувствовать успех, ребенок считает себя незаслуживающим его;
- подавленность, тревожность, депрессивность, грустное настроение;
- отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство собственной испорченности;
- истерическое поведение, быстрая потеря самоконтроля;
- трудности в общении с ровесниками;
- отчуждение от братьев и сестер;
- терроризирование младших детей и сверстников;
- жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);
- амбивалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного возраста).

## **3) ИЗМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ:**

- неспособность защитить себя, непротivление насилию и издевательствам над собой, смирение;
- самоповреждающее поведение;
- резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);
- прогулы в школе, отказ и уклонение от обучения;
- Употребление алкоголя и наркотиков;
- принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, стирке, мытью, уходу за младшими и их воспитанию);
- отрицание традиций своей семьи вследствие не сформированности социальных ролей, вплоть до ухода из дома (характерно для подростков).

## **4) ИЗМЕНЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ РЕБЕНКА:**

- снижение самооценки;
- суицидальное поведение;

## **5) ПОЯВЛЕНИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ:**

- боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком;
- аффективно-тревожное восприятие одиночества;
- личностные психопатии различной этиологии (наркотические зависимости, булимия, анорексия, нарциссические, мазохистские и прочие личностные расстройства);
- боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от участия в занятиях физкультурой или плаванием или снимать нижнее белье во время медицинского осмотра);
- с защитной целью носит много одежды;
- неприятные ощущения в теле: головная боль, боли в области желудка и сердца, частые боли в горле и т.п.

## **МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖЕРТВУ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ТАЙНЫ**

- изоляция;
- угроза, приводящая к отчаянию;
- демонстрация силы;
- обман или подкуп;
- интенсификация обыденных требований с целью приучить жертву
- постоянно идти на уступки.